

四庫全書

子部

欽定四庫全書

普濟方卷二百六十二 明 周王朱橚 撰

乳石門

乳石發浮腫

附論

石發而身體腫者以食飲過溫不能勞動致熱氣蓄壅於肌肉不得宣散故也亦有外感風濕內有停水與石勢相薄其氣滯塞致浮腫者然食飲過溫不自勞動其為腫也但體熱虛腫而已若風濕停水而發腫則必心

中煩滿小便澀不可不辯也

方

硝石湯

出聖濟  
總錄

治乳石發動上攻頭面浮腫

硝石

草薢

防風

去

黃連

去鬚  
炒

大黃

剉  
炒

甘草

炙

各一兩地榆

剉

羌活

去蘆  
頭

桑根

白皮

剉  
炒

龍骨

各一兩  
半

代

赭石

煨一兩  
半

桂

去粗皮  
剉碎

黃芩

去黑皮  
各半兩

石韋

去毛  
二兩

枳殼

剉

去核  
炒一兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半入生薑三片同煎至

八分去滓溫服

赤茯苓散

出聖惠方

治乳石發動心神煩躁悶亂身體面

目浮腫喘促坐臥不得

赤茯苓

澤瀉

柴胡

去苗

漢防風

豬苓

去黑皮

麥

門冬

去心

桑根白皮

剉

犀角屑

紫蘓莖葉

子苓

木通

剉各一兩

川大黃

一兩半剉炒

檳榔

一兩半

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分葱白二

七寸煎至六分去滓不計時候溫服

防風湯

出聖濟總錄

治乳石發動上衝頭面疼痛浮腫心

神恍惚

防風

去

當歸

切

澤瀉

葳靈仙

去

甘草

炙

黃連

去

醫

虎杖

各一兩半

石韋

去

天門冬

去

槐實

炒

白石脂

研

地榆

各二兩

石膏

碎三兩

生地黄

切焙

大黃

剉

黃芩

去

犀角

鎔

硝石

研各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半入生薑一分煎至八分

溫服

漢防風散

出聖惠方

治乳石發動身體浮腫痰結不食腹

中滿悶喘息氣阻

漢防風

赤茯苓

木通

剉

枳殼

麩炒去穰各三分

桑根

白皮

剉

紫蘇莖葉

剉

大腹皮

剉

前胡

去蘆各一兩

黃芩

甘草

炙微赤剉

半夏

湯洗七遍去滑炒半兩

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓溫服日三四服

枳殼散

出聖惠方

治乳石發熱心神煩躁身體赤腫胸中

煩悶

枳殼

麩炒微黃色  
去穰一兩

桑根白皮

劉

牛旁子

微炒

川升麻

黃芩

赤茯苓

各一兩

石膏

二兩

漢防風

大青

沙參

去蘆頭

麻黃

去根節  
各三分

甘草

半兩  
剉用

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓溫服日三四服

茯苓湯

出聖濟  
總錄

治乳石發腫

赤茯苓

去黑皮

淡竹葉

一握  
切碎

白朮

甘草

炙

人參

枳實

去穰  
麩炒

梔子仁

各一兩

大黃

剉炒  
二兩

黃芩

去黑心  
三兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服

升麻湯

出聖濟  
總錄

治乳石熱發腫初覺壅者

升麻

大黃

剉碎  
微炒

黃芩

去黑  
皮

枳實

去  
麩炒

芍藥

各三兩

當歸

切  
焙

甘草

炙各  
一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服

紫雪散

出聖  
惠方

治乳石發熱身體微腫頭面瘡出

紫雪

二兩

川升麻

黃芩

葳蕤

各一兩

犀角屑

甘



草

生

梔子仁

各半兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓溫服

日三四服

木通湯

出聖濟總錄

治服石人水氣內積面目腰膝腫硬

小便澀

木通

炙

桑根白皮

炙剉各半兩

赤芍藥

桔梗

剉炒各三兩

葶藶子

隔紙炒

白茅根

微炒各一兩

右粗擣篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓空腹

溫服日再

紫蘂子丸

出聖濟總錄

治乳石風濕外搏水飲內停身面

微腫小便澀

紫蘂子

微炒一合半

陳橘皮

去心焙

杏仁

去皮尖雙仁炒

防已

赤茯苓

去黑皮各一兩

葶藶

隔紙炒三分

右各搗羅為末鍊蜜丸如小豆大每服五十丸加至

三十九空心用桑白皮赤小豆煎湯下日再服

吳藍散

出聖惠方

治乳石毒氣攻注皮膚浮腫心神煩躁

體熱不得睡臥

吳藍 漢防風 黃芩 梔子仁 玄參 犀角

屑 川升麻 白鮮皮 甘草 生剉各半兩 川大黃 剉微

炒 川朴硝 各一兩 桑根白皮 剉三分

右為散每服四錢以水一中盞煎至七分去滓溫服

日三四服

芍藥湯 出聖濟總錄 治乳石發熱堅腫

芍藥 枳實 去穢炒 大黃 剉炒 升麻 各二兩 當歸 切焙一兩

右粗搗篩每服三錢以水一中盞煎七分溫服去滓  
空心食前日午各一服

赤茯苓散

出聖濟總錄

治服石人水氣內積面腫

赤茯苓

去黑心

牽牛子

炒各一兩半

枳殼

去穰炒

陳橘皮

去白

焙

甘草

炙各三分

右搗羅為散每服二錢如茶點服不拘時

生麥門冬湯

出聖惠方

治鍾乳發寒熱胸中壅塞面腫手足煩痛

足煩痛

生麥門冬

去心微焙一兩 豉 微炒一合

右粗搗篩每服三錢水一盞葱白三莖拍碎同煎至

六分去滓空心溫服

檳榔湯

出千金方

凡服散之後忽身體浮腫多是取冷過

度所致

用檳榔三十枚搗碎水八升煮取二升分再服一方

用子搗作末其皮咬咀以湯七升煮取二升去渣內

子末為再服

治乳石發動周身患腫不能回轉者為久坐不行又不飲

酒藥氣滯在皮膚之內血脉不通也

出聖濟  
總錄

宜飲酒冷水洗自勞即瘥不能行者遣人扶持強行  
使支節調暢乃止亦不得過度使反發熱倘發熱者  
還當洗之

治乳石發動四肢面目浮腫者為飲食溫久不自勞力

藥與正氣相隔也

出聖濟  
總錄

但飲熱酒冷食自勞及洗浴即瘥

治乳石發動腹背熱如杯如盤許大者

出聖濟總錄

但以冷石隨熱處熨之

治乳石發熱腫

出本草

用夏冰熨之

治患丹石發腫

出本草

以腫處於濕地上卧熨之地熱易之

乳石發癰腫

附論

乳石性本炎悍服者苟將適失度食飲不時致熱毒發

泄不擇所出或癰疽發背或腸癰瘡毒不可勝治間雖有未嘗服石而毒氣潰漏如是者亦以腑臟久蓄熱毒或以胞胎之初稟受石氣其來有自治法當先以疎利之劑散其毒而外施傳貼之術蓋六腑不和而成癰若乳石散動熱氣內乘六腑六腑血氣行於經脉經脉為熱所搏而外有風邪乘之則石壅結血氣否而成癰腫也

方

無名異膏

出聖濟總錄

治乳石癰毒發背



無名異

研

沒藥

研

麝香

研

檀香

剉

丹砂

研

沉香

剉

騏驎

竭

研

乳香

研

突厥白

剉

白欬

剉

白芨

剉

白芷

剉

雞舌香

雞骨香

研

當歸

切

芎藭

剉

槐枝

剉

牛膝

剉

防風

去

義

判大黃

剉

柳枝

剉

桑根

剉

半兩

蠟

四兩

鉛丹

十二兩

清油

二

勑

右除油蠟丹及前八味研末外並剉研先熬油令沸下

檀香等一十四味剉藥煎候白芷赤黑色絞去滓再煎

入蠟鉛丹以柳篋攪候變黑色滴於水中成珠子軟便

得所後下無名異等八味研末攪令勻以麝盒盛用故

帛塗貼瘡上每日一次換以瘡為度

甜菜膏

出聖濟  
總錄

治乳石發癰疽瘡止痛生肌

甜菜

三兩

生地黄

各三兩

大戟

炒一兩

當歸

切焙

防風

去叉半兩

續斷

白芷

芍藥

各半兩

甘草

炙三分

莽草

半兩

芍藥

三分細

辛

去苗葉

大黃

炒判

黃耆

炙判

杜仲

去粗皮酥炙

黃芩

去黑心各一分

蜀椒

去目并合口者  
炒去汗一分

右除豬脂外判碎先熬脂令沸下諸判藥煎候白芷赤  
色絞去滓覓合盛每日三五次塗傳瘡上

必効膏

出聖濟總錄

治乳石癰疽發背瘡毒止痛吮膿

油

一兩研

麝香

研一錢

膩粉

研一錢

蠟

各三分

楓香脂

一兩半

丹

砂

細研半兩

鹽

半兩

白芷

剉

乳香

研

當歸

炙

桂

去粗皮剉

藁本

去苗土剉

細辛

去苗土剉

蜜陀僧

研各一兩

右先將油煎令沸次下白芷等六味剉藥煎候白芷

赤黑色漉出下蠟楓香候鎔盡以綿濾去滓下鉛丹

蜜陀僧乳香以柳篋攪煎候變色滴水成珠子即

下鹽丹砂麝香粉等攪勻傾於磁盆內安淨土上一

宿除火毒用故帛上攤貼日二以瘥為度

麥門冬湯

出聖濟總錄

治乳石發動癰疽發背熱渴

麥門冬

去心焙

赤茯苓

去黑皮

石膏

碎

生地黄

焙升麻

人參

知母

焙山梔子仁

芎藭

各三分

小麥

半升黃耆

剉

甘草

炙枳實

炒芍藥

各二兩黃芩

去黑皮前胡

去蘆頭

各一兩半

右剉如麻豆大每服五錢水二盞入生薑五片棗二枚

擘破竹葉十片同煎至一盞去滓溫服不拘時

黃耆湯

出聖濟總錄

治乳石發動癰疽內熱大渴

黃耆

灸剉

前胡

去蘆頭

大黃

剉炒各一兩半

栝蒌根

二木通剉

黃芩

去黑心

芍藥

赤茯苓

去黑皮

甘草

灸剉

知母

焙人

參

當歸

切焙

升麻

生地黄

研取汁

小麥

各一兩

右除地黃外粗搗篩每服五錢水二盞竹葉二七片切碎

煎至一盞去滓入地黃汁半合再煎沸空心日晚各一服

黃耆散

出聖惠方

治乳石發動生癰腫煩疼壯熱口乾心煩大

小便澀滯

黃耆

剉

川升麻

黃芩

各一兩

犀角屑

地柏

微炙

玄參

赤茯苓 當歸 甘草 生 枳殼 麩炒微黃去穢 梔子仁 各三分 川芒

硝 一兩半 木香 連翹 各半兩 川大黃 剉碎二兩微炒

右為散每服四錢水一中盞竹葉三七片煎六分去滓溫服

連翹散 出聖惠方

治乳石發毒生癰腫煩熱疼痛口乾心煩筋脉

拘急頭項強硬

連翹 黃耆 剉 川升麻 葛根 剉 地骨皮 麥門冬 去心 犀

角屑 黃芩 各三分 木香 甘草 生用 沉香 防風 去蘆頭 紅

雪 二兩 石膏 碎二兩

右為散每服四錢水一中盞入竹葉三七片煎至六分去滓  
溫服日三四服

犀角丸

出聖濟  
總錄

治乳石發動癰疽發背一切毒氣止痛化膿

犀角屑

一兩

大黃

切

黃芩

去黑心

升麻

防風

去

當歸

切

人參

黃

耆  
炙梔子仁

黃連

去乾藍

甘草

炙各

巴豆

十枚

去皮心

炒研令細

右除巴豆外搗羅為末入巴豆和勻鍊蜜為丸如桐子大

每服五丸米飲下快利為度

黃耆丸

出聖濟  
總錄

治乳石發動癰疽發背一切熱毒及惡瘡

黃耆

炙

犀角屑

各一兩半

黃連

去鬚

茯神

去木

當歸

切焙

防風

去

芍藥

升麻

赤茯苓

去黑皮

黃芩

去黑心

甘草

炙

各

半兩

木通

剉一兩

麝香

研半兩

右除麝香外搗羅為末入麝香研和勻鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十九生薑湯下未效加至三十九

淋洗方

出聖濟總錄

治乳石發熱初欲作腫

用石燕子七枚粗搗篩以水三升煮取二升頻淋洗癰腫處以瘡為度若觸穢必不善四體慄慄飲食無



味亦可含香丸如不瘳者先服一盞五香湯取微利  
一行佳則不煩沐浴也

治五毒發背

出本草

用金星草和根淨洗慢火焙乾秤四兩入生甘草一  
錢搗末分作四服每服用酒一升已來煎三二沸後  
更以冷酒三二升相和入餅器內封却時時飲之忌  
生冷油膩毒物

五香連翹湯

出聖濟  
總錄

治乳石發動癰疽發背諸腫毒

及惡核瘰癧

連翹

去梗

木香

沉香

董陸香

研

麝香

研

射干

升麻

獨活

去蘆頭

桑寄生

剉各三兩

丁香

一兩

木通

剉

大

黃

剉各三兩

右除麝香外粗搗篩和勻每服五錢水二盞煎至一

盞半去滓入竹瀝二分再煎沸溫服不拘時忌猪肉

蒜生菜宜兔肉

五味子湯

出聖濟總錄

治乳石發為癰疽

五味子

炒

前胡

去蘆頭

當歸

切焙

黃耆

炙

人參

各一兩

小

麥

台一

黃芩

去黑心

麥門冬

去心

甘草

炙

桂

三分

粗

去

皮

升麻

各半兩

生乾地黃

焙一兩

右粗搗篩每服五錢以水二盞棗一枚擘破生薑三

片煎至一盞去滓溫服空心日午各一服

犀角散

出聖惠方

治乳石發作生癰疽心神煩躁口乾肩

背拘急四肢疼痛

犀角屑

三

升麻

黃耆

剉

玄參

薺芎

麥門

冬心

去地骨皮

木香

各一兩

甘草

一分生用

黃芩

三分

葛根

一兩

川大黃

二兩

剉炒

右為散每服四錢以水一中盞入竹葉三七片煎至六分去渣溫服日三四服

玄參散

出聖惠方

治乳石發動煩熱生癰腫疼痛

玄參

黃芩

葳蕤

地骨皮

梔子仁

連翹

各三

紫雪

二兩

川升麻

沉香

川大黃

各一兩碎微炒

犀

角屑

三分

甘草

半兩生剉

右為散每服四錢以水一中盞入竹葉三七片煎至六分去滓溫服日三四服

增損當歸湯

出聖濟總錄

治乳石發為癰疽腫痛煩熱

當歸

切

赤茯苓

人參

前胡

去蘆頭

黃芩

去黑心

芍

藥

甘草

炙判各一兩

小麥

一合

竹葉

半兩

麥門冬

去心二兩

焙

桂

去粗皮半兩

右粗搗篩每服五錢以水二盞棗二枚擘破煎至一盞去滓空心日午各一服

犀角湯

出聖濟總錄

治乳石發動初覺皮膚有癰毒恐成

癰疽及腑臟壅滯寒熱口乾心煩

犀角

鎔

知母

剉各半兩

木通

剉

芍藥

升麻

薺芎

麥門冬

去心焙

黃芩

去黑心

甘草

炙

葳蕤

各三兩

右粗搗篩每服五錢用水二盞煎至一盞下竹瀝半

合馬牙硝一錢更煎數沸濾去滓空心溫服快利為

度未利再服

人參湯

出聖濟總錄

治乳石發動癰疽虛熱

人參

甘草

炙

黃耆

炙

芍藥

各一兩半

當歸

切

赤茯苓

焙

去黑皮

芎藭

黃芩

去黑心

木通

剉各一兩

右粗搗篩每服五錢以水二盞竹葉一十片切碎生

地黃汁少許煎至一盞濾去滓溫服空心日午各一

漏蘆湯

出聖濟總錄

治乳石發動癰疽發背

漏蘆

去蘆頭

白欬

剉

黃芩

去黑心

枳殼

去穰

芍藥

炒

甘

草

炙

麻黃

去根

升麻

剉各一兩

大黃

剉炒一兩半

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服

空心日午各一

升麻散

出聖惠方

治乳石發熱毒生癰腫炊疼痛口乾煩

悶

川升麻

枳殼

去穰麩炒黃

黃芩

甘草

生判

赤芍藥

當歸

各一兩

木香

三分

川芒硝

二兩

川大黃

二兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓溫服

日三四服以利為度

大青散

出聖惠方

治乳石發動生癰腫煩熱疼痛口乾心



躁

大青

分三十片

石膏

兩一地骨皮

甘草

生劉黃

芩

犀角屑

吳藍

川升麻

各一兩

右為散以水三大盞入黑豆一合煎至一盞半去滓  
分為三服不計時候溫服

獨活散

出聖惠方

治乳石發動生癰赤腫毒氣攻注筋脉

拘急言語蹇澁心神煩躁

獨活

川升麻

黃芩

各三分

漢防已

犀角屑

防風

去蘆頭

甘草

生剉各半兩

石膏

一兩

右為散每服半兩以水一中盞煎至五分去滓入竹瀝半合溫服日三四服

大黃湯

出聖濟總錄

治乳石發動癰疽發背疎利毒氣

大黃

剉炒一兩

梔子仁

犀角屑

各半兩

栝蒌根

二兩

黃芩

去黑心

甘草

炙剉各三分

右粗搗篩每服五錢用水一盞半煎至一盞濾去滓

空心日午溫服

麻仁丸

出聖濟總錄

治乳石發動癰腫發背及臟腑滯

大麻仁

研二兩

木香

分三枳殼去穰

炒

大黃

剉炒各一兩

甘草

炙半兩

惡實

炒一兩

右除麻仁外搗羅為末入麻仁研勻鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十九丸溫水下未效加至三十九丸

地黃煎

主補虛除熱散乳石癰疽瘡癰等熱

以生地黃隨多少取汁於銅鉢中重湯上煮勿蓋釜令氣得泄煎去半更以新布濾絞去麤滓穢又煎令

如飴則成矣此用地黃須肥大味濃者作煎甘美東南  
地黃堅細味薄作煎鹹不美

若腫有根堅如鐵石帶紫赤色者服湯後

仍以小小艾炷當腫上灸之日三兩炷為佳養如常  
法

蔓菁子膏

出千金方

治凡發瘡腫方

蔓菁子

炒

杏仁

黃連

胡粉

各一兩

水銀

二兩

右別搗蔓菁子杏仁如膏以猪脂合研令水銀減以

塗瘡上日三夜一

治散發赤腫者方

出千金方

生地黃

五兩

大黃

一兩

生商陸

三兩

杏仁

四十枚

右切醋漬一宿猪膏一升煎商陸令黑去滓摩腫上日三夜一

龍葵散

出聖濟總錄

治黑瘡腫焮因乳石發動者

龍葵根

一握洗淨細切

乳香

研

黃連

去鬚各三兩

杏仁

去皮尖雙仁六

十枚

右細剉與研藥同為細末其瘡作頭未傍攻者即須

作餅厚如三四錢許可瘡大小傳之瘡若覺冷微痒者即易之痒不可忍切不得搔動直候一炊久即看瘡中似石榴子戢戢者然後去藥時時以甘草湯微溫洗了即以蠟帛貼之瘡若傍攻作穴即內藥於穴中以滿為度瘡若赤色者即是熱肉麪所為不用龍葵根以蔓菁根代之黑瘡愈後只得食猪魚葱蒜終身更不得食羊血食即再發

又方

出聖濟  
總錄

甘草

一觔二兩到

大麥

三升黃連

去鬚二兩

右搗篩以沸湯和作餅貼瘡上乾則易不過四五度

瘡

生地黄煎

出聖濟總錄

治乳石藥氣發熱風熱相并致癰

腫瘡癰經年不愈

生地黄

五觔洗切以木杵臼搗絞汁

黃精

十二觔洗切以木杵臼搗絞汁

白蜜

五升

右相和於銀石器中慢火煎如膏為度以磁盒盛每

服生薑湯調下半匙至一匙日二夜一

治乳石發動心神煩躁肩背拘急生癰腫疼痛大腸壅

滯

出聖濟  
惠方

黃連

去鬚

川芒硝

各一兩

右細羅為散每服煎甘草湯調下二錢日三四服

又方

出聖  
惠方

黃連

三兩  
去鬚

苦參

三兩  
剉

黃芩

三兩

右搗碎分為三度每度以水二升煮取一升去滓者



冷煖洗癰瘡日三度宜避風

治單服硫黃發為癰方

出聖惠方

以米醋和豉研熟如膏以塗癰上燥則易之甚良

治乳石發癰腫疼痛不可忍方

出聖惠方

以滑石搗羅為細散用水調塗癰腫處乾則更塗之

又方

出聖濟總錄

○凡發背多於背兩髀間起如粟米或痛

或痒不過數日遂至於死臨困之時已闊三寸高一

寸瘡有數孔孔上以手按之諸孔皆膿出初作此候

急取淨土水和為泥捏作餅厚二分闊一寸半作大艾炷灸泥上百壯乾則易餅仍服五香連翹湯及鐵漿攻之又發背未作大膿可水箭射之浸石令冷熨之瘥

乳石發身體生瘡

附論

服石之法覺飢則食坐卧衣服如之則將適有度而石勢不作倘將適失度則其熱壅滯血氣澁結此身體所以生瘡且履屨至微一過乎溫則足指生瘡况身體覆

晷周密之至鮮有不為患者若外有風邪內有積熱乘於血氣血氣壅滯亦使生瘡且服石將慎至難若不能將息特宜勿服非但服之苦瘦熱更增他疾性行躁暴唯多怒恚飲食日減形體日消妻小不能供承卑下何其能濟此皆由將慎失度致使然也人之無檢慎勿輕服至於背折腦裂藥物無及也婦人則發乳體腫帷箔不修特宜審慎自量其力將息尤佳

方

犀角散

出聖惠方

治乳石發動心神煩躁身上生瘡四肢

疼痛小便赤澀

犀角屑

甘草

生用各半兩

子芩

川芒硝

玄參

川大黃

剉碎微炒

川升麻

各二兩

麥門冬

一兩半去心焙

沙參

蘧麥

枳殼

麩炒微黃去白各三分

右為粗散每服四錢以水一中盞入淡竹葉三七片

豉五十粒煎至六分去滓溫服日三四服

牛蒡子丸

出聖惠方

治乳石發動皮膚生瘡赤腫疼痛煩

熱不止

牛蒡子

微炒

川大黃

判微炒

黃連

去鬚各一兩

川升麻

黃

芩

秦艽

去苗

白蒺藜

微炒去刺

枳殼

麸炒黃去穰各三分

防風

去蘆

沙參

去蘆

梔子仁

各半兩

右搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每

服溫漿水下三十丸日三四服

黃芩散

出聖惠方

治乳石發動煩熱滿悶身體生瘡

黃芩

川芒硝

麥門冬

去心

川大黃

判微炒碎

梔子仁

各一兩 白蘚皮 秦艽去苗 枳殼炒微黃去穰各三分 甘草半兩

生剉

右味為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓溫服日三四服

升麻湯

出聖惠方

治乳石發熱身體微腫生瘡

升麻

葳蕤

各一兩半

黃芩

去黑心二兩

犀角

鎔

甘草

炙剉各一

兩 梔子仁

一十枚

右粗搗篩每用五兩水三盞煎至一盞半去滓下紫

雪一錢分溫二服以利下兩三行為度仍用黃連湯

塗瘡腫上一方有大青二分并入酥一分蜜半合煎

黃芩散

出聖惠方

治乳石發熱煩悶心躁身體生瘡

黃芩

川芒硝

川大黃

判碎微炒各二兩

麥門冬

三兩去心

焙

梔子仁

三十枚

甘草

一兩生用

右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分葱白七寸豉五十粒煎至六分去滓溫服日三四服一方無薑葱豉煎名大黃湯一方無芒硝名黃芩湯

知母芒硝湯

出聖濟  
總錄

治乳石發動表裏俱熱身體生

瘡或發癰癤

知母

焙

甘草

炙剉各  
一兩

梔子仁

二十  
枚

黃芩

去黑心  
二兩

大

黃

剉炒  
四兩

芒硝

錢一

右粗搗篩每服五錢水二盞煎至一盞半去滓入芒

硝末更煎三兩沸分溫二服兼治大小便不利

升麻湯

出聖濟  
總錄

治乳石發腹內胸中悉有瘡

升麻

一兩  
半

烏梅

十枚  
去核炒

黃芩

去黑  
心

黃連

去  
鬚

蘇蔓根



甘草

炙各一兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓細細

含嚥日三四服

麥門冬湯

出聖濟總錄

治乳石發兩股生瘡熱痒兼頭痛

麥門冬

去心焙

知母焙澤瀉

甘草

炙剉各一兩

粳米

五合

右粗搗篩每服五錢先以水五盞煎小麥二合竹葉

二十片至三盞去滓下藥末重煎至一盞半去滓分

溫二服空心日晚各一

飛雪湯

出聖惠方

治乳石發動身體生瘡

麻黃

去根節

川芒硝

各四兩

石膏

二兩

黃芩

三兩

右搗碎以水五升煮取二升去滓內生雞子白二枚搗令勻以帛浸藥汁拭瘡以瘥為度

麥門冬湯

出聖惠方

治乳石發體熱生瘡

麥門冬

去心焙三兩

甘草

炙判桂去粗皮各一兩半

人參

一兩

右粗搗篩每服五錢水三盞入葱白二莖煎至一盞半去滓內豉二合更煎三兩沸去滓分溫三服日三

一方不用桂

葱白湯

出聖濟總錄

治乳石發動生瘡熱氣衝胸

葱白

三莖切

豉二  
合梔子仁

十四枚劈破

右以水三盞煎至二盞去滓分三服早晨日午至晚

各一服

治乳石發動皮膚生瘡壯熱疼痛口乾

出聖惠方

烏豆

一升

川芒硝

三兩

生地黃汁

一小盞

右以水三升煮豆至一升去豆更煎如稀飭下蜜三

合及硝地黃汁更煎一二十沸收於磁合中每抄半匙細細含嚥津以得利即瘥

黃連湯

出聖濟總錄

治散發生細瘡者

黃連

芒硝

各五兩

右咬咀以水八升煮黃連取四升去滓內芒硝令烊漬布取貼瘡上數數易換多少酌看之

葱豉飲

出聖濟總錄

治乳石發動體上生瘡結氣腫痛

豉

半切一分葱白

握一

右以水二盞半煎至一盞去滓溫服至三四劑

甘草湯

出聖濟總錄

治乳石發動煩熱脹滿身體生瘡

甘草

灸

麻黃

去根節各一兩

右以水二盞酒半盞煎取一盞半先以火徧灸背令

熱欲汗出即熱服之以衣覆卧須臾大汗出即瘥

治散發瘡痛不可忍方

出千金方

用冷石三兩下篩為末粉瘡上日五六度即燥須臾

痛亦定

治服乳石患瘡腫方 無問大小或如粟米則加意療

之出聖濟  
總錄

或井水淋或鹽湯洗或以指槌破即以指甲細搗旁  
邊又以唾數塗之或以蒼耳湯浸洗之或以冷石恣  
意熨之以瘥為度

治乳石發動脚指生瘡者為履韞太溫方

出聖濟  
總錄

當以脚踐冷地以冷水洗之即瘥

乳石發口舌生瘡

附論

夫手少陰心之經也心氣通於舌足太陰脾之經也脾氣通於口若臟腑否澁石氣不宣上衝於口與舌故令生瘡蓋服乳石之人食飲不時穀氣不足石性暴烈其熱乘於心脾也熱積而瘡瘡甚而爛復不得食則熱極可知解之之劑不可緩也

方

黃連散

出聖惠方

治乳石發動口舌生瘡咽喉不利

黃連

去鬚

麥門冬

去心

川升麻

黃蘗

判各一兩

大青

玄

參黃芩

甘草

生剉各半兩

射干

二兩

右為散每服四錢以水一中盞入竹葉二七片煎至六分去滓不計時候溫服

升麻散

出聖惠方

治乳石發動心神煩悶四肢拘急口舌

生瘡

川升麻

二兩

烏梅肉

十枚微炒

黃芩

黃蘗

杏仁

湯浸去皮

共雙仁麩炒微黃

梔子仁

黃連

去鬚

菰蔞根

甘草

生剉各一兩

兩



右為散每服四錢以水一中盞入竹葉二七片煎至

六分去滓不計時候溫服

黃蘗散

出聖惠方

治乳石發動口舌生瘡頭痛心煩乾嘔

惡食

黃蘗

剉

犀角屑

各三分

川升麻

玄參

甘草

生剉各一

兩牛蒡子

半兩微炒

麥門冬

一兩半去心焙

石膏

二兩

右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至

六分去滓不計時候溫服

大青散

出聖惠方

治乳石發動體赤煩亂口舌瘡爛表裏

如燒疼痛不能食

大青 梔子仁

川大黃

剉研炒

川升麻

各一兩

薔薇

根

二兩剉

甘草

半兩生剉

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

香豉湯

出聖濟總錄

治乳石發動口中瘡爛舌強而燥不

得食味者為食少穀氣不足藥氣積在胃脘故也

豉半斤 葳蕤

甘草

炙剉各半兩

黃蘗

去粗皮蜜炙剉

麥門冬去心

焙各一兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

日再

前胡湯

出聖濟總錄

治乳石發口生瘡爛頭項煩痛胸脇

脹滿寒熱手足逆冷或乾嘔惡聞食氣上氣欲絕

前胡

去蘆頭

芍藥

大黃

剉炒

黃芩

去黑心

甘草

炙剉各二兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半棗五枚擘破煎至八

分去滓溫服日再若氣實者加茯苓去黑皮二兩胸滿塞者加枳殼去穰麩炒一兩吐逆胸中冷者加乾薑炮二兩口燥者加麥門冬去心焙二兩增減以意量之

治乳石發動因飲食失度毒熱上攻口舌生瘡

出聖惠方

黃蘗

黃連

去鬚

川升麻

各二兩

龍膽

三兩去蘆

苦竹葉

一握

右細剉以水四大盞煮取二大盞去滓溫含冷吐五十口止每日五七度用以瘥為度

升麻散

出聖濟總錄

治乳石發動口舌生瘡連頰腫痛

升麻

防風

去

甘草

炙各半兩

雞腸草

三分

芎藭

大青

各一分

右搗羅為散於瘡腫處針出惡血鹽湯漱用半錢貼

之日三

鉛霜散

出聖濟總錄

治乳石發動口舌生瘡

鉛霜

研

白礬

燒各一兩

麝香

研錢

黃蘗

去粗皮蜜炙一兩

右搗研為散每用半錢摻瘡上有涎即吐之

黃蘗湯

出聖濟總錄

治乳石發動口瘡

黃蘗

去粗皮蜜炙二兩

黃連

去鬚升麻各一兩

龍膽

一兩半

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓時時

含嚥

浮萍丸

出聖惠方

治乳石發動口舌生瘡

乾浮萍草

升麻

黃蘗

鉛丹

炒研各半兩

右搗研為末鍊蜜丸如雞頭肉大每服一九含化嚥

津

梔子仁湯

出聖濟總錄

治乳石發體熱煩悶口中瘡爛表

裏如燒痛不能食

梔子仁

十枚

黃芩

去黑心

大黃

剉炒各三兩

豉

二合

右粗搗篩每服五錢水一盞半入香豉一合煎至八

分去滓食前溫服

黃芩湯

出聖惠方

治乳石發食飲失度口中發瘡

黃芩

去黑心三兩

石膏

碎五兩

甘草

炙

升麻

各二兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓放冷

用漱口一日十遍咽喉有瘡稍稍嚥之一方有薤薇

根三兩

龍腦散

出聖濟總錄

治乳石發動口舌生瘡

鉛霜

分一龍腦

半錢

滑石一分

右各研為細末和勻每用一字摻瘡上吐涎瘡

又方

出聖惠方

鉛霜

分杏

仁

半兩

湯浸去皮

炙

膩粉

一分

匙

右研令勻每用如雞頭肉大以綿裹含嚥津



乳石發兩脚卒冷兩脇腋卒熱并口噤

附論

經言脉有陰蹻陽蹻有陰搏此在三陰位脉也足太陰脾脉也脾為中州含藏陽氣壓水脉者也若人體和平則脾能行陽氣暖其三陰三陰暖則足能舒適若脾虛不能含藏則地氣但泄陽上騰而三陰堅塞足便冷也或有踵緩及不仁者則加之以腎肝之氣不足此少陰厥陰之闕也所以足無載運之功而不能蹻捷其力是陰搏其陽皆由臟虛所生陽氣傷狂而陰不能獨理因

有發熱口噤及腋下熱不可近者即三陽傷盛之所致也况服石增熱食餌失度在陰為疹可外溫其足內置陽氣於三陰則愈也在陽為疹可微冷於外又以寒藥散其內熱其疴豈能逃乎

方

蔓青子湯 治口噤氣上欲絕

蔓青子

升三

茯苓

兩三

蓼藍子

人參

薺萐

甘草

炙黃芩

白朮

兩各二

右切以水五升煮蔓菁子取二升去滓內餘藥煮分服若口噤以物灌之即瘥

治兩腋熱不得相近

滑石

一斤

寒水石

三斤

芒硝

一斤

右擣散取絹一尺分作袋盛散藥結口更互於腋下夾之勿住取涼冷止

治兩脚卒冷

以醋漿溫置盆中以浸脚即瘥

乳石發脚氣附論

乳石性暴羸瘠痼疾之人難以控制其發動則臟腑否塞熱則引飲飢則加食水穀乖度和氣反傷飲濕下流攻注腰脚故令脚氣發動寒熱更作脚膝疼痛或致腫滿肌肉瘡痺况脚氣之候不可使邪氣實常令服藥疎利臟腑兼乳石攻發尤不可忽也○夫乳石之性堅剛猛烈服餌之後恒在腸胃若人因虛而服之復補養過度使臟腑否塞石勢行於經絡致氣力乍覺強益腎氣

堅盛遂便不能節慎情欲過度或飲食無常或觸冒寒暑腎氣既虛風邪所搏石氣留滯不得宣通則令脚氣發動也

方

犀角散

出聖惠方

治服乳石太多致臟腑充滿又酒麪熱毒

過度致令脚氣壅塞心神煩熱口乾悶亂咽喉不利

犀角屑

玄參

去蘆頭

麥門冬

去心

紫蘇莖葉

檳榔

各一兩 川升麻

葳蕤

射干

甘草

炙微赤

沉香

黃芩 薺芩

吳藍

各三分

木香

半兩

訃薑根

一兩

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分入淡竹葉二七片去滓不計時候溫服

大青龍散

出聖惠方

治服乳石補養過度酒肉熱麪太

多致脚氣發盛攻心煩熱燥渴悶亂神思恍惚

大青 犀角屑

玄參

黃芩

麥門冬

去心

川升

麻

薺芩

知母

吳藍

各三分

甘草

半兩炙微赤

石膏

枳殼

麩炒微黃去穰

川大黃

剉碎微炒

紅雪

葛根

剉各一兩

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分淡竹葉  
二七片煎至六分去滓不計時候溫服

子芩散

出聖  
惠方

治服乳石三焦壅盛脚氣忽發心中煩

悶肢節疼痛口乾頭痛

子芩

葛根

剉

川升麻

赤芍藥

各三分

木通

剉

紫

蘇莖葉

赤茯苓

蘆根

剉

大腹皮

剉

檳榔

麥

門冬

去心

犀角屑

各一兩

柴胡

去苗

石膏

二兩

甘草

炙微赤

半兩剉

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候溫服

檳榔散

出聖惠方

治服乳石致臟腑壅滯發脚氣腫滿四

肢煩疼口乾心躁夜多恍惚

檳榔

桑白皮

剉

川大黃

剉碎微炒

犀角屑

各一兩

茯苓

地骨皮

黃連

去鬚

葳蕤

麥門冬

去心

川升麻

各三分

甘草

半兩炙微赤剉

赤芍藥

黃耆

枳殼

麩炒去穰各半兩

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候溫服



吳藍湯

出聖惠方

治服乳石壅毒氣盛令脚氣發動心神

躁熱口乾頭痛脚膝煩疼

吳藍

犀角屑

紫蘇莖葉

各一兩對

獨活

地骨皮

川升麻

赤茯苓

赤芍藥

黃芩

桑白皮

麥門冬

去心各三分

紫雪

二兩

石膏

細研二兩

甘草

半兩炙微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分青竹茹

一分煎至六分去滓不計時候溫服

柴胡散

出聖惠方

治因服乳石致臟腑壅滯及脚氣欲發

或增寒壯熱頭痛心煩眼目昏悶頭旋欲吐不納飲  
食

柴胡

去蘆

犀角屑

川芒硝

各一兩

葛根

剉

赤茯苓

甘草

炙微赤剉

黃芩

各半兩

石膏

二兩

葳蕤

玄參

去蘆

川升

麻

各三分

麥門冬

去心三分

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分豉一百粒煎至六分去滓不計時候溫服

升麻湯 治久服鍾乳及諸臟腑熱盛又酒麪過度脚

氣壅上氣悶煩渴引飲不止喘急語短喉痛結澀

升麻

木香

各二兩

犀角

鎊

甘草

炙

黃芩

去黑心各四兩

玄

參

一兩半

葳蕤

切焙五兩

麥門冬

去心焙

括萎

各六兩

射干

三兩

右㕮咀每服五錢生薑一棗大拍碎水二盞浸一宿  
平旦煎取一盞去滓溫服如魚氣者每服加檳榔末

半錢

石膏散

出聖惠方

治服乳石氣壅致脚氣發盛心煩悶頭

痛咽乾不能飲食

石膏 犀角屑 玄參 桑白皮 紫雪 檳榔

各一兩 甘草 炙微射干 各半兩 川升麻 三兩

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

升麻湯 治熱毒風兼脚氣因乳石動發不覺心悶語澁或失音

升麻 青竹茹 剉各二兩 石膏 碎三兩 木香 獨活 去蘆頭

犀角 鎔 防風 去義 黃芩 去黑心 各一兩半

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓入紅  
雪一錢竹瀝一合地黃汁一合再煎令沸不拘時服  
訶黎勒丸 治常服乳石補養過度復酒肉熱麪不絕  
脚氣常發服此效

訶黎勒皮

剉

大黃

剉

檳榔

剉

各三兩

木香

二兩

大麻仁

別

研

三兩甘草

炙二兩半

朴硝

三分

枳殼

去穢

麤炒二兩半

炒

右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服四十丸漸加至五  
六十九丸溫熟水下日三服常令通利

柴胡湯 治服乳石脚氣發動或增寒壯熱頭疼心悶

眼目疼惡心欲吐腦痛須令微汗

柴胡

去苗一分

葛根

剉切焙各二兩

白茯苓

去黑皮

桂

去粗皮

麥門冬

去心焙

麻黃

去根節各兩半

黃芩

去黑心一兩

右粗搗篩每服五錢水一盞煎至八分去滓食後溫服衣被覆取微汗汗不可太過

葳蕤湯 治脚氣因乳石發動服前方八味升麻湯漸

退語雖不澁但口乾唇焦頭痛氣急兼嗽此是脚氣

退乳石氣衝上更服此方

葳蕤

桑根白皮

薺芎

去蘆頭各二兩

五加皮

甘草

炙各一兩半

生麥門冬

去心一兩

右為剉散每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後

服日三

犀角湯

治素服乳石酒肉熱麪發動脚氣衝心熱悶

腹痛

犀角

鎔

木香

甘草

炙各二兩

木通

剉三兩

黑豆

合二兩

連皮

大腹

劉五兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓入紅雪三錢攪勻不拘時候溫服須臾通利為度

葶藶丸

治乳石發動脚氣兼上氣喘急欬嗽小便澀

服利水藥小便不利大便反利宜服利小便

葶藶

紙上炒

防已

甘草

炙各二兩

貝母

去心一兩半

杏仁

去皮

尖雙仁炒別

研二兩半

右搗四味為末與杏仁和勻以棗肉丸如梧桐子大



每服三十九煎大棗桑根白皮湯下未利再服

麥門冬湯 治服乳石脚氣發動熱悶氣逆不下飲食

無味

麥門冬

去心焙

甘草

炙各二兩

白茯苓

去黑皮

桔蓐根

各三兩

右粗搗篩每服五錢生薑一棗大拍碎水一盞半煎

至八分去滓溫服日三

葱白湯 治金石毒脚氣

葱白

切七莖

甘草

炙二兩

生薑

切一兩

陳橘皮

去白焙一兩半

右為剉散以水五盞同煎至三盞去滓分溫三服

地黃湯 治乳石發動熱毒攻上氣急傷肺或吐血

唾血

生地黃汁

五合

黃明膠

一斤

生藕汁

三合

如無生藕汁即單用生地黃汁亦可

右先以地黃汁微火煎令膠銷盡傾甕器內下藕汁攪令勻分為二服不拘時

薑墨煎 治乳石發動熱盛或吐血唾血不定兼腳氣

攻衝

生薑汁一合 墨一研

錢

蜜

合

右和勻細細呷之

乳石發小便淋澁

附論

乳石發動小便淋澁者勢歸腎熱氣所致也蓋腎主水而惡燥水行小腸入胞為溲便腎氣和平則溲便順流腎氣宿虛復因石熱將溫過度虛熱相搏則溲便數而澁且痛也數為虛澁為熱澁甚而痛故為淋瀝

方

滑石散 治乳石發動患淋積年或數日輒發

滑石

二兩

冬葵子

瞿麥穗

陳橘皮

去白焙各一兩

赤茯苓

去黑皮

芍藥

黃芩

去黑心

蒲黃

微炒

芒硝

石

常

去毛各一兩半

右為散每服二錢煎後方桑白皮飲調服空心食前日二服漸加至三服取利為度

桑白皮飲

出聖濟總錄

下前藥

桑根白皮

剉一兩半

木通

剉

百合

各二兩

白茅根

剉二兩半

甘草

炙

滑石

各一兩

右細剉每服五錢水三盞煎至二盞去滓每用半盞

調前散如口乾即食前更服此飲

澤瀉散

出聖惠方

治乳石發動小便淋澁不通心中煩熱

小腹妨痛

澤瀉

三分

蘧麥

玄參

黃芩

木通

剉

麥門冬

去心

赤茯苓

各一兩

甘草

半兩炙微赤剉

桑螵蛸

二十枚微炒

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分淡竹葉

二七片葱白七寸煎至六分去滓溫服日三四服

麥門冬散

聖惠方

治乳石發動小便赤澁心腹煩悶

麥門冬

去心

車前子

葵根

剉

黃芩

各三分

赤茯苓

川芒硝

川升麻

木通

剉各一兩

甘草

炙微赤剉碎半兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓溫服

日三四服

地黃散

出聖惠方

治乳石發動小腸中熱下血淋澁臍下

疔痛

生乾地黄

二兩

犀角屑

蜀葵根

判

當歸

判微炒各三分

赤

芍藥 黃芩

木通

判各一兩

葵子

甘草

生判各半兩

右為粗散每服四錢以水一中盞入淡竹葉二七片

煎至六分去滓溫服日三四服

升麻散

出聖惠方

治乳石發動熱氣盛實四肢煩悶氣脉

緊急數小便淋瀝宜服之

川升麻

黃蘗

炙微赤判碎

甘草

炙微赤判碎

黃芩

滑石

各一兩

犀角屑

蒲黃

各三分

白鴨通汁

二合

赤芍藥

三分

右為粗散每服三錢以水一中盞入竹葉二七片煎

至六分去滓入鴨通汁半合不計時候溫服

滑石散

出聖惠方

治乳石發動小便淋澀小腹妨悶心神

煩熱

滑石

二兩

木通

剉

石韋

去毛

蘧麥

川芒硝

冬葵子

黃芩

白茆根

剉各一兩

甘草

半兩炙微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞去滓溫服日三四服

犀角散

出聖惠方

治乳石發動心神煩熱小便淋澀臍下



疼痛

犀角屑 川升麻 玄參 川大黃

判碎 微炒

赤芍藥

木通

當歸

判微炒 各一兩

滑石二兩

右粗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分葱白七寸煎至六分去滓溫服日三四服

滑石木通湯

出聖濟總錄

治乳石發動淋澀

滑石

五兩

木通

判三兩

石韋

去毛

瞿麥穗

各二兩

冬葵子

五合

右粗搗篩每服五錢水三盞入茆根少許判碎同煎

至一盞半去滓更下芒硝少許煎三兩沸分溫二服

空心一服食久再服微利為度

鷄蘇湯

出聖濟總錄

治乳石發動血淋不止

雞蘇

一握去根剉暴

石膏

碎二兩

竹葉

一握切

蜀葵子

別為末每服旋

入一錢

右除葵子外粗搗篩每服二錢水一盞半煎至一盞

去滓下葵子末一錢更煎至八分溫服日二

大黃湯

出聖濟總錄

治乳石發動熱結小便淋澀小腹痛

大黃

判炒

赤茯苓

去黑皮各一兩

大麻仁

半升別入每服旋入

合一

右除麻仁外粗搗篩每服五錢以水三盞入麻仁一

合同煎至一盞半去滓分溫二服空心一服日午再服

車前湯

出聖濟總錄

治乳石發動熱淋澀痛

車前草

去根判

葵根

削洗令淨切片暴乾各一兩

木通

判一兩半

右粗搗篩每服四錢水一盞半煎至一盞去滓入芒

硝末半錢更煎一兩沸溫服日再取利為度

螬蛸湯

出聖濟總錄

治乳石發動熱結小便淋澀小腹痛

桑螬蛸

炙黃二  
十枚

黃芩

去黑心  
一兩

右細剉每服五錢水二盞煎至一盞去滓分作二服  
空心溫服日午再服

治乳石發卒患淋方

出聖  
惠方

以船底青苔一塊如鴨子大用水三盞煎至一盞半  
去滓分溫二服空心日午各一

茅根湯

治乳石發熱淋及發熱體氣昏濁不痛不痒

小便赤澀

用白茅根淨洗剉暴乾半觔粗搗篩每服五錢水二盞煎至一盞去滓食前溫服日二又方以生茆根二觔搗爛以新布絞汁細飲之

治乳石石淋狀如碎砂石下者

用車前子一升絹囊盛以水五盞煎至二盞經宿勿食頓服之須臾砂石自下

葵子湯 治乳石發熱小便數少如淋

用冬葵子揀五合如無子切陳根一兩亦得粗搗篩  
每服四錢水一盞半煎至八分去渣溫服日三

治乳石發熱口乾小便澀

用葦蕤五兩搗碎每服三錢水一盞煎至七分去滓  
溫服但得微利即瘥

又方

用甘蔗削去皮寸截嚼嚙汁如口痛不能嚼者取汁  
飲之先曾利即勿服蓋甘蔗能利大小腸故也

若患淋者為久坐溫處或乘鞍馬坐處太熱熱入膀胱故也

但冷食冷水洗冷石熨腹不過一日即瘥止千金翼云若不止可下之不下則殺人

乳石發大小便不通

附論

大小便澀者由大小腸虛受邪氣所致也且腑有高下而肺腑上通天氣中接土腑下行大腸為傳導之腑也有風氣熱結即大便乾澀而不通順或發癰腫口鼻乾

燥或腎腑有虛則心肺俱病使小便赤而澁也或腎氣虛熱膀胱不足加以渴飲即小便淋澁皆由病虛不能主其腑也且形能受味氣能致精氣散則精虛味益則體實體實之人筋骨有餘因勞精氣精氣既衰即招其病故石氣流入膀胱作為淋疾則非止石氣下行此肺遭熱盛傳之於腎腎為精竭純陰自孤石氣懼陰不入便投其膀胱膀胱受邪遂成淋也淋狀合澁數赤熱而痛何以知之澁至故知肺傳於子也數至為子被母逼



水急奔下也赤熱至為心與石氣相搏也痛至為本臟自  
虛客氣衝擊也所以服石藥者藉其少滋味而助精氣  
即神明內固邪不能入也何以知之因石虛竭之人其  
陰好怒而交接難畢其病名強中或不交接其精自流  
也或為消利或作消渴皆由少服諸石用之傷勞也夫  
遇茲候等可救其病失時不療便至天枉不可全服補  
虛之藥恐變諸疹常以不虛不實於大腸不寒不燥於腠  
理能調神氣有何患乎○乳石發大小便不通以石勢

乘於大小腸故也。蓋石氣慄悍，方其將適，得宜飲食有節，則慄悍之氣沉潛而不作。將適失宜，食飲不節，沉潛者於是騰躍而四達，乘於腸間，則津液內燥而為結澁。此大小便所以不通也。○夫乳石發動，大小腸壅滯者，由陰陽不和，榮衛否澁，腸胃虛弱，津液不通，糟粕結於腸中，膀胱積於留水，若不利其關格，無以得其宣通也。

方

解散 治盛熱實大小便赤秘

一名大黃湯

升麻 大黃 黃連 甘草 黃蘗

各三兩 芍藥六兩

黃芩

四兩

梔子仁

十四枚

竹葉

切

豉

各一升

白鴨通

五合

右咬咀以水三斗先煮鴨通竹葉取一斗二升去滓

澄清取一斗次內藥煮取三升分三服若上氣加杏

仁五合腹滿加石膏三兩一方有犀角屑一兩無白

鴨通名大黃散治體熱心煩大小便難

大腹皮散 治乳石發動心胃痰結頭目昏悶大小腸

壅滯不通四肢煩疼飲食不下

大腹皮

劉

前胡

去蘆

赤茯苓

枳殼

麩炒微黃去穢

川芒硝

各一兩

旋復花

甘草

炙

半夏

湯浸七次去滑

陳橘皮

湯浸去白

焙各半兩

川升麻

分三

川大黃

二兩劉

碎微炒

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓溫服日三四服

犀角散

治乳石發動心膈氣滯痰結不下飲食腹脇

滿悶四肢煩疼大小腸壅滯不通

犀角屑

半兩

甘草

炙微赤

子芩

三分

赤茯苓

枳實

麩炒

微黃

柴胡去苗木通

紫蘇莖葉各一兩

半夏

湯浸七次去滑

蘧

麥

檳榔

各三分

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓溫服日三四服

蘧麥散

出聖惠方

治乳石發動壅熱上攻心神煩亂大小

腸壅滯

蘧麥

大青

黃芩

赤茯苓

白茅根

各一兩

甘

草

炙半兩

川芒硝

二兩

梔子仁

三分

川大黃

一兩

半兩

剉微炒

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分豉一百

粒葱白七寸煎至六分去滓溫服日三四服

升麻湯

聖濟總錄

治乳石發熱四體煩滿脉至急數大小

便不通

升麻

三兩

黃蘗

微炙剉碎

黃連

去鬚

芍藥

各一兩

甘草

炙令赤

黃

芩

去黑心

白鴨屎

淡竹葉

切各二兩

梔子仁

十四枚

右除竹葉鴨屎外搗篩為粗散先以水三升煮竹葉

鴨屎去滓至一升半每服一盞入藥四錢煎至七分

去滓溫服早晨日午晚後各一若上氣加杏仁五合

石膏三兩

前胡湯

聖濟總錄

治乳石發動氣上不得食嘔逆大小便

不通氣滿煩悶折熱下氣

前胡

去蘆頭

黃芩

去黑心

甘草

炙微赤

赤茯苓

去黑皮各二兩

杏

仁

湯浸去皮尖炒令黃四十枚

枳殼

去穰麤炒一兩

大黃

剉炒令香一兩半

梔

子仁

十枚

右粗搗篩每服五錢水三盞入生薑一分拍碎同煎

至一盞半去滓分溫三服早晨日午晚食前各一服  
如利多喫酢飯止之不可頻服隔三兩日更服一方  
無枳殼有枳實一兩炙

茯苓飲

聖濟  
總錄

治乳石發動煩熱身體微腫不能食飲

大小便不利

赤茯苓

去黑皮

黃芩

去黑心各二兩

甘草

炙令赤

栝蒌根

剉人碎

參桂

去粗皮

白朮

炒令香各一兩

枳殼

去穰麤炒黃一兩半

右粗搗篩每服五錢水三盞煎至一盞半去滓分溫



二服空心日晚食前各一

羚羊角散

聖惠方

治乳石發動三焦氣壅心神煩悶大

小腸壅滯不通

羚羊角屑

檳榔

木通

枳殼

麩炒去穢各一兩

紅雪

二兩甘草

半兩炙微赤剉

川升麻

三分

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓溫服日三四服

芒硝湯

聖濟總錄

治乳石發動上氣熱實不鮮心腹滿悶

大小便不通口燥目赤

芒硝

黃連

去鬚

黃芩

去黑心

甘草

炙令赤各一兩

梔子仁

大黃

剉炒各半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服日

二早晨日晚各一

赤茯苓散

一名葵子散出聖惠方

治乳石發動大小腸壅滯臍

腹妨悶

赤茯苓

去黑皮

木通

剉各三分

葵子

半兩

惡實

炒

枳殼

去穢炒

大黃

剉碎微炒  
各一兩

右為散每服二錢煎紫蘇湯調下如人行十里再服

以利為度

枳實湯

聖惠方

治乳石發動大小腸壅滯不通脇肋妨悶

胃膈痰結不下飲食

枳實

去穰麩炒令黃

前胡

去蘆頭

檳榔

剉

木通

剉各一兩

甘草

炙半

兩  
大黃

一兩半  
剉炒

右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑半分煎取六分

去渣不計時候溫服一方有木香

檳榔散

聖惠方

治乳石發動心躁煩熱痰結不下飲食

大小腸壅滯腰背疼痛

檳榔

川芒硝

枳殼

麩炒去穢

川大黃

各一兩剉炒

甘草

半兩炙微赤剉

右為細末每服二錢煎竹茹湯調下如人行十里再

服以利為度

三黃丸

聖惠方

治乳石發熱大小腸壅滯不通

川大黃

剉碎  
微炒

黃芩

黃連

去鬚各  
三兩

右為末鍊蜜丸和搗三二百杵丸如梧桐子大每服  
不計時候以煖水下四十丸

大麻仁飲

聖濟  
總錄

治乳石發動致人虛勞下焦有熱骨

節煩疼肌急內痞小便不利大便澁難口乾舌燥氣  
乏少力折石敗熟

大麻仁

五合研爛  
絞取汁

豉

三合以綿  
裹作袋子

右以水四盞將麻仁研爛絞取汁并豉袋子與水同

煎至三盞去滓分為四服早晨日午晚食前各一夜  
更一服

治乳石發虛勞下焦虛熱骨節煩疼肌肉急小便不利  
大便數少吸吸少氣折石敗熱

出聖濟  
總錄

用大麻子三合研令極爛以水三盞煮至一盞半分  
二服早晨日午各一

治乳石發動大便難腹中堅脹者為積久腹中乾糞不

去

出聖濟  
總錄

宜銷酥及蜜并石膏末和服令滋潤腹中即下若不  
下更服大黃朴硝等下之便瘥

冷熱熨方

千金方

若大小便秘塞不通或淋瀝溺血陰中  
疼痛此是熱氣所致用此法即愈

前以冷物熨小腹已次以熱物熨之又以冷物熨之  
若小便數此亦是取冷所為煖將理自愈

乳石發下痢

附論

夫乳石之性剛猛氣多炎上理之傷溫則火轉為熾內

煎脾肺苦熱遂成其渴飲水過多則洩腸胃得水則吐腸得水則寒而腸雖寒火炎不滅水漸流下而為行潦遂變下痢胃氣虛冷水穀不消在陽則益熱不食在陰則腸鳴而洩也

方

黃蘗湯

出聖濟總錄

治乳石發夾時行兼有客熱下血痢

止血

黃蘗

微炙剉碎

黃連

去鬚

石榴皮

剉碎

芍藥

各三兩

乾薑

炮製



一 阿膠炙令燥 梔子仁十五枚

右粗搗篩每服四錢以水二盞煎至一盞去滓溫服

日再

黃耆散

出聖惠方

治乳石發動熱毒傷胃下痢腹痛

黃耆

地榆

當歸

劉微炒各一兩

茜根

黃蘗

各三分

犀

角屑

半兩

右為散每服半兩以水一大盞煎至六分去滓稍熱

分二服日三四服

木香散

出聖惠方

治乳石發動變下痢赤色腹痛不可忍

木香

三分黃連

去鬚當歸

剉微炒

地榆

剉各一兩

甘草

炙微赤剉半兩

赤芍藥

兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候稍熱服

地榆散

出聖惠方

治乳石發動煩熱腹痛變為下痢不欲

飲食

地榆

一兩木香

半兩葳蕤

當歸

剉微炒

黃芩

各三分

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓溫服不計時候

黃連湯 治解散除熱止痢

甘草

炙

升麻

各一兩

黃連

剉三兩

豉

五合

梔子仁

十四枚

右切以水三升煮取一升分溫服

犀角散

出聖惠方

治乳石發動心神虛煩變為下痢腹痛

不思飲食

犀角屑

木香

各半兩

地榆

一兩

赤芍藥

黃芩

各三分

右為散分為六服每服以水一中盞煎至六分去滓  
不計時候稍熱服

白朮散

出聖惠方

治乳石發動多服涼藥過度致脾胃虛

冷腹痛下痢不能飲食

白朮

當歸

劉微炒

陳橘皮

用湯浸去白切焙各一兩

人參

去蘆頭三

分

木香

半兩

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚  
煎至六分去滓不計時候稍熱服

梔子仁湯

聖濟總錄

治乳石發下痢

梔子仁

二十枚

人參

黃連

去鬚

甘草

炙令赤色 剉各二兩

右粗搗篩每服四錢用水二盞煎至一盞去滓溫服

早晨日午晚後食前各一

香豉飲

出聖濟總錄 名葱白豉湯

治乳石發下痢

豉

五合 葱白 一握

乾薑

炮製搗末二兩

甘草

微炙剉搗末一兩

右先以水三盞入甘草乾薑三味末各二錢煎至二

盞去滓下碎葱白一合豉一合更煎一盞去滓分為

三服早晨日午近晚各一服

治癰腫熱盛取冷過多寒中下痢食完出

甘草

炙

乾薑

附子

炮各六兩

蜀椒

二百三十枚去汗

右切以水六升煮取三升分服之忌如常法

黃連湯

出聖濟總錄

治乳石發白痢

黃連

去鬚綿裹一兩

白蜜

一兩

童子小便

二盞

右以水二盞與小便漬藥一宿煎至一盞半去滓分  
為二服弱人三服早晨日午晚後溫服

梔子湯

聖濟總錄

治乳石發赤白痢兼熱煩悶

梔子仁

十枚

薤白

一握切

豉

一合

右以水三盞煎至一盞半去滓分溫二服弱人分三

服食前服

黃連湯

聖濟總錄

治乳石發下痢

黃連

去鬚一兩

豉

五合外臺秘要方不用豉

烏梅

取肉十枚

右剉碎以水三盞入童子小便一盞薤白三莖拍碎

同煎至二盞去滓分溫三服空心日午晚後各一

梁米湯

聖濟  
總錄

治乳石發散已經快利熱尚不退兼痢

不斷

梁米

一合

黃連

去鬚剉  
碎三兩

右粗搗篩以水四盞煎至一盞分三服去滓食前溫

服一日令盡

治乳石下痢及常服壓石方

聖濟  
總錄

用豉三兩炒令黃香候冷搗篩為末每服二錢冷水

調下又方服乾豉即止多服益佳



解乳石痢方

聖濟  
總錄

用紫筍茶二兩搗羅為末每服三錢以水一盞煎至七分和滓服之早晨日午晚後食前各一

治藥發下痢

用乾薑五兩切以水二升煮取一升去滓頓服

治熱毒赤白痢

用羊肝去膜切以水淘二十遍血盡以粟米飯拌作麪餅以水煮熟漉着漿水中淘之乾漉以美蒜齏候

極飢食之不過三兩頓即瘥

解石痢方

聖濟總錄

用真好芥淡煮濃汁服二三盞重者三服輕者一二服瘥

若下痢如寒中者為行止食飲犯熱所致

宜速脫衣冷食冷飲冷水洗即瘥

服乳石備飲常法

附論

服乳石者莫急於將適將適之法莫先於飲食有所宜

者有所當忌慎者有不可不預備而防其疾之將然者  
今特叙之

方

服乳石之人所宜飲食方

出聖濟  
總錄

取猪脂并猪肉可一月三五度食之佳又以水牛頭  
蹄及白羊頭蹄猪肉作薑豉隨意食之果實宜食梨  
柿等凡欲服熟羊肉麪食之類宜先食三五匙冷飯  
即不妨熟食訖仍速以冷飯壓之行步釋散乃善服

石人有性喜麪嗜酢不能禁慎者宜食冷淡糠酢百沸紫麪及水摸餅即無妨冷韭羹大補時時宜食之又服石人雖可飲酒而不宜多飲酒多則失食味失食味則不能食不能食則令人虛熱虛熱則令石數發惡寒况又損石力為酒能壓石令人風虛腰脚弱若能飲又能食大佳

服石忌慎方

出聖濟  
總錄

凡服石飲食切忌熱麪白酒陳臭酢漿雞犬羖羊牛

肉鮑魚鮑臭魚脯血羹冷酒有灰酒蕎麥小豆胡麻  
動作切忌乘飢炙灼熱湯沐浴夏月空腹忿恚及過  
市廛及喪家并哭泣衝熱忍飢登甚穢廁親不潔婦  
人蔬菜忌芸薹胡荽茺杞芥菜大蒜果實忌梅  
杏桃李藥物忌烏頭附子天雄蒼耳等悉宜消息以取  
安平且服石將慎至難不能將息不若勿服蓋背折  
腦裂發乳體腫之疾徃徃因此得之故耳夏月不宜  
多食猪肉冷水恐腸滑利不止及傷冷飲食不消致

成霍亂也

服石後將慎紫麪饅飴方

出聖惠方

取烏豆不拘多少取濃汁代水和麪依常法作麪食還向此豆汁中煮熟乾則添豆汁勿加水候熟入猪羊菜豆等臠食之和此等作麪尤佳

水摸餅方

出聖濟總錄

作餅欲上鍤時以水塗摸生餅上表裏燂之勿食胡餅燒餅等大壅熟故也

宜食麴餅方

出聖惠方

取麴拌如常餅法細切如小豆大以麴於簸中拌令如丸煮熟乾漉出置冷水中又漉出置盤中以粉再拌麴丸內鐺中煮令極熟乘熱任以五味汁及諸肉臠食之大涼補腰脚於藥無犯

又方

出聖濟總錄

取新大麥為麴和肉汁及作餅食甚良凡大麥熟蒸為餅和黑豆相拌食良夏日冒熱遠行食晚失飢石

必發動宜作大麥餅將行飢即食之壓石療飢甚妙  
若覺渴及熱盛

慎勿食炙肉羊羴尤惡自死肉性平冷者通食仍  
勿熱進恐成消渴

乳石發動諸藥不治者

附論

乳石發動各有方劑以對病證固有疾勢異常諸藥所  
不能治者因別叙備用之法

方



葳蕤酒

出聖濟  
總錄

治乳石發動諸藥不效

葳蕤

升麻

薺芎

人參

各三兩

大黃

劉

梔子仁

芒硝

甘草

炙剉各二兩

黃芩

去黑心

葛根

劉

紫草

去蘆頭

犀角

鑄各四兩

銀屑

二兩半

豬脂

臘月者三兩

露蜂房

五兩

大豆

浸暴乾炒  
去皮一合

右除豬脂銀屑外搗羅為細末以無灰酒二升密封

浸一宿次將豬脂用好酒一升鍊開以銀屑相和研

入前藥酒內更浸一宿每服取酒一二盞飲之

豆豉酒

出聖惠方

治乳石發動諸藥不治

醇酒

一升五合

右同煮沸熱澄清旋飲一盞良

治乳石發熱困諸藥不效者

出聖惠方

豬脂

五合成鍊者

芒硝

四分

右以水三升入葱白五合切豉心三合同煮取一升  
濾去滓下豬脂芒硝二味再煎一沸分五服以瘥為  
度

治乳石發諸藥療不瘥者

出聖濟  
總錄

用硝石明白者一塊如杏子大不拘時逐旋含化嚥

津



普濟方卷二百六十二